TACTICAL MECHANICAL TOURNIQUET

Manufacturer
SAFEGUARD MEDICAL TECHNOLOGIES LTD.
THE OLD FACTORY
WEST LINDEN DRIVE
HERSTHORPE, HU4 5PW
ENGLAND

Authorised Representative in the EC
SAFEGUARD TECHNOLOGIES LTD.
WILLOW GROVE
KILGANY, CO WICKLOW
A63 EY89, IRELAND

REF Catalogue Number
LOT Batch code
Consult instructions for use
Do not re-use
Use-by date
Single sterile barrier system with protection on the primary package of natural rubber latex
Medical device
Non sterile
Keep away from sunlight
Keep dry
Unique device identifier

ONE-HANDED OPERATION INSTRUCTIONS

إرشادات الاستخدام بيد واحدة

Pokyny pro ovládání jednou rukou

Betjeningsvejledning til én hånd

Instructies voor eenhandige bewerking

Mode d'emploi pour une application à une main

Anleitung für den einhändigen Gebrauch

Οδηγίες για εφαρμογή με το ένα χέρι

הוראות לשימוש בשתי ידיים

Egykezes kezelési útmutató

Leiðbeiningar fyrir einnar handar notkun

Istruzioni di utilizzo con una mano

Bruksanvisning med én hånd

Instrukcja zakładania jedną ręką

Instruções de aplicação com uma mão

Návod na jednoručné použitie

Instrucciones de uso con una sola mano

Bruksanvisning med en hand

Tek elle kullanım talimatları

TWO-HANDED OPERATION INSTRUCTIONS

إرشادات الاستخدام بكلتا اليدين

Pokyny pro ovládání oběma rukama

Betjeningsvejledning til to hænder

Instructies voor tweehandige bewerking

Mode d'emploi pour une application à deux mains

Anleitung für den zweihändigen Gebrauch

Οδηγίες για εφαρμογή με τα δύο χέρια

הוראות לשימוש בשתי ידיים

Kétkezes kezelési útmutató

Leiðbeiningar fyrir tveggja handa notkun

Istruzioni di utilizzo con due mani

Bruksanvisning med to hender

Instrukcja zakładania dwiema rękami

Instruções de aplicação com duas mãos

Návod na obojručné použitie

Instrucciones de uso con dos manos

Bruksanvisning med två händer

Iki elle kullanım talimatları



OTF050_0081_Rev 0_06-22

@ safeguardmedical.com

SAFEGUARD MEDICAL

TO RELEASE/REMOVE THE TMT

عند الاضطرار إلى تحرير/إزالة عاصبة TMT

Uvolnění/sejmutí škrtidla TMT

Sådan løsnes/fjernes TMT

Het TMT losmaken/verwijderen

Pour libérer/enlever le TMT

Lösen/entfernen des TMT

Αποδέσμευση/αφαίρεση του TMT

לשחרור/הסרה של חוסם העורקים



ENGLISH

PRODUCT NAME: TMT – Tactical Mechanical Tourniquet

GENERAL DESCRIPTION: The Tactical Mechanical Tourniquet (TMT) is a windlass tourniquet. The device consists of a strap with hook-and-loop and a rigid plastic buckle, receiver, control plate, and torsion bar.

INTENDED USE: The intended use of the Tactical Mechanical Tourniquet is to control severe bleeding from a limb.

USER PROFILE: The TMT is intended to be used by both laypersons as well as medically trained professionals.

PATIENT PROFILE: The TMT is to be used on those patients with severe bleeding from a limb.

CLINICAL BENEFITS: The TMT controls bleeding from an extremity by circumferentially compressing the injured limb, at least (~5cm above the bleed site) to an extent where arterial occlusive pressure is reached.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS: Device can apply at least 200mmHg of pressure.

PRODUCT CLAIMS: Device comprises of a windlass and locking feature to control arterial blood flow to upper and lower extremities. Device maintains efficacy throughout its intended duration of use and during patient transport. Device is available in multiple colorways. Design of device is suitable for use on two-handed self-application. Device is single-use, suitable for application for a range of limb circumferences. Device includes dedicated label for recording time of application.

CONTRAINDICATIONS: N/A

RESIDUAL RISKS/WARNINGS: For use on limbs only. Not recommended to remain in place for more than 2 hours. Use beyond 2 hours will potentially cause nerve or tissue damage. The risk is increased with longer application time. Device is single use. Reuse risks cross-contamination and product functionality. There is a risk of ischaemia-reperfusion injury/post-tourniquet syndrome on removal of the tourniquet, which can be limb-threatening and life-threatening. Dispose of as clinical waste after use. Use past expiry date risks loss of product functionality.

DISPOSAL: Dispose of as clinical waste after use.



1. Speed buckle / **2.** Speed buckle receiver / **3.** Retaining clip
4. Torsion bar / **5.** Carriage plate / **6.** Strap

This is a single-use device. Always store in one-handed configuration.

ONE-HANDED OPERATION INSTRUCTIONS:

1. Hold the end of the strap by the white time label tab, allow the TMT to fall open with the pull symbol facing away from you. Place around the injured extremity, high and tight above the wound.

2. Pull time label tab until upper strap is separated from lower strap.

3. Grip the strap close to the speed buckle, firmly pull up, out, and away from the body, and then downward, in a quick ratcheting motion. Repeat step until snug around extremity.

4. Adjust/rotate the TMT on the extremity for ease of access to the torsion bar. Twist the torsion bar until bleeding stops and pulse is not present.

5. Lock the torsion bar into retaining clip. Secure excess strap by wrapping around and tucking under self. Legibly write time of application onto dedicated time tab.

TWO-HANDED OPERATION INSTRUCTIONS:

1. Hold the end of the strap by the white time label tab, allow the TMT to fall open. Grab TMT by the speed buckle and separate the two sections.

2. Wrap the TMT around the injured extremity high and tight above the wound, ensuring device is not twisted. Reconnect the speed buckle.

3. Pull time label tab until upper strap is separated from lower strap.

4. Grip the strap close to the speed buckle, firmly pull up, out, and away from the body, and then downward, in a quick ratcheting motion. Repeat step until snug around extremity.

5. Adjust/rotate the TMT on the extremity for ease of access to the torsion bar. Twist the torsion bar until bleeding stops and pulse is not present.

6. Lock the torsion bar into retaining clip. Secure excess strap by wrapping around and tucking under self. Legibly write time of application onto dedicated time tab.

TO RELEASE/REMOVE THE TMT:

Unwrap excess strap, put positive pressure on torsion bar, apply upward pressure on the retaining clip and push torsion bar out, then unlock speed buckle. Only a trained medical professional should remove the tourniquet once applied.

REPORTING: Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to manufacturer (vigilance@safeguardmedical.com) and applicable national competent authority.

ARABIC

اسم المنتج: TMT عاصبة ميكانيكية تكتيكية

الوصف العام: تشير العاصبة الميكانيكية التكتيكية (TACTICAL MECHANICAL TOURNIQUET (TMT إلى عاصبة دوارة. يتكون الجهاز من حزام مزود بخطاف ولاشوطة وإبزيم بلاستيكي صلب، إضافة إلى مستقبل، لوح تحكم و قضيب التواء.

الاستخدام المستهدف: الاستعمال المستهدف للعاصبة الميكانيكية التكتيكية هو السيطرة على النزيف الحاد من أحد الأطراف.

توصيف المستخدم: العرض من عاصبة TMT هو أن يستخدمها كل من الأشخاص العاديين وكذلك المتخصصين المدربين طبيا.

توصيف المريض: تم تصميم عاصبة TMT لتكون استخدم في حالة المرضى الذين يعانون من نزيف حاد من أحد الأطراف.

TO RELEASE/REMOVE THE TMT

A TMT kioldásához/eltávolításához

Til að losa/taka af TMT

Aprire/rimuovere il TMT

For å frigjøre/fjerne TMT

Aby zwolnić/zdjąć opaskę TMT

Para soltar/retirar o TMT

Uvolnenie/zloženie TMT

Para liberar/retirar el TMT

För att lossa/ta bort TMT

TMT'yi açmak/çıkarmak için

ČESKY

NÁZEV VÝROBKU: TMT – Taktická Mechanická Turniket

VŠEOBECNÝ POPIS: Taktický Mechanický Tourniquet (TMT) je škrtidlo s vratidlem. Tento prostředek se skládá z popruhu se suchým zipem a přezkou z tvrdého plastu, zásuvné části, ovládací desky a vratidla.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: Zamýšleným použitím prostředku Taktické Mechanické Tourniquet je kontrola závažného krvácení z končetiny.

PROFIL UŽIVATELE: Škrtidlo TMT je určeno pro použití jak laickou veřejností, tak i vyškolenými zdravotníky.

PROFIL PACIENTA: Škrtidlo TMT je určeno k použití u pacientů se silným krvácením z končetiny.

KONTRAINDIKACE: Žádné

KLINICKÉ PŘÍNOSY: TMT kontroluje krvácení z končetiny obvodovým stlačením poraněné končetiny (~5 cm nad místem krvácení) alespoň natolik silným, aby se dosáhlo arteriálního okluzivního tlaku.

CHARAKTERISTIKY ÚČINNOSTI: Prostředek může vyvinout tlak až 200 mm Hg.

TVRZENÍ O VÝROBKU: Prostředek obsahuje vratidlo a zajišťovací prvek ke kontrole proudění tepavé krve do horních a dolních končetin. Prostředek si zachovává svou účinnost po celou zamýšlenou dobu použití a během transportu pacienta. Prostředek se dodává v různých barevných provedeních. Konstrukce prostředku je vhodná pro samoaplikaci jednou rukou nebo oběma rukama. Prostředek je na jedno použití, je vhodný pro použití pro různé obvody končetin. Prostředek obsahuje speciální štítek pro záznam času aplikace.

ZBYTKOVÁ RIZIKA / VAROVÁNÍ: Pouze pro použití na končetinách. Nedoporučuje se ponechat na místě déle než 2 hodiny. Při použití delším než 2 hodiny může dojít k poškození nervů nebo tkání. Při delší době aplikace se riziko zvyšuje. Prostředek je na jedno použití. Při opakovaném použití může dojít ke křížové kontaminaci a ztrátě funkčnosti výrobku. Po odstranění škrtidla existuje riziko ischemicko-reperfuzního poranění nebo syndromu po zaškrcení, který může ohrožovat končetinu a život. Po použití zlikvidujte jako klinický odpad. Použití po uplynutí data použitelnosti může vést ke ztrátě funkčnosti výrobku.

LIKVIDACE: Po použití zlikvidujte jako klinický odpad.

1. Rychlouvolňací přezka / **2.** Zásuvná část rychlouvolňací přezky
3. Uupevňovací spona / **4.** Vratidlo / **5.** Nosná deska / **6.** Popruh

Tento prostředek je na jedno použití. Vždy skladujte v konfiguraci pro použití jednou rukou.

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU:

1. Uchopte konec popruhu za bílou kontrolku s časovým štítkem tak, aby se škrtidlo otevřelo symbolem tahu otočeným směrem od vás. Pevně obtočte kolem poraněné končetiny v dostatečné výšce nad poraněním.

2. Zatáhněte za kontrolku s časovým štítkem, aby se horní část popruhu oddělila od spodní.

3. Uchopte popruh u rychlouvolňací přezky a rychlým rachovým pohybem jej pevně vytáhněte nahoru směrem od těla a pak dolů. Škrtidlo opakovaným tohoto kroku pohodlně upevněte kolem končetiny.

4. Polohu škrtidla TMT na končetině posouváním a otáčením upravte tak, abyste mohli snadno vsunout vratidlo. Otáčejte vratidlem, dokud se krvácení nezastaví a krev nepřestane pulzovat.

5. Zajistěte vratidlo v upevňovací sponě. Přebytečnou délku popruhu upevněte omotáním a zasunutím dospod. Čitelně napište čas aplikace na štítek, který je k tomu určený.

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ OBĚMA RUKAMA:

1. Uchopte konec popruhu za bílou kontrolku s časovým štítkem tak, aby se škrtidlo otevřelo. Uchopte TMT za rychlouvolňací přezku a oddělte dvě části popruhu od sebe.

2. Pevně omotejte TMT kolem poraněné končetiny v dostatečné výšce nad poraněním a dbejte na to, aby se prostředek nezkroutil. Znovu zapněte rychlouvolňací přezku.

3. Zatáhněte za kontrolku s časovým štítkem, aby se horní část popruhu oddělila od spodní.

4. Uchopte popruh u rychlouvolňací přezky a rychlým rachovým pohybem jej pevně vytáhněte nahoru směrem od těla a pak dolů. Škrtidlo opakováním tohoto kroku pohodlně upevněte kolem končetiny.

5. Polohu škrtidla TMT na končetině posouváním a otáčením upravte tak, abyste mohli snadno vsunout vratidlo. Otáčejte vratidlem, dokud se krvácení nezastaví a krev nepřestane pulzovat.

6. Zajistěte vratidlo v upevňovací sponě. Přebytečnou délku popruhu upevněte omotáním a zasunutím dospod. Čitelně napište čas aplikace na štítek, který je k tomu určený.

POKYNY PRO UVOLNĚNÍ A SEJMUTÍ ŠKRTIDLA TMT:

1. Uchopte konec popruhu, přitlačte na vratidlo, zatlačte na upevňovací sponu směrem nahoru a vytlačte vratidlo ven, poté otevřete rychlouvolňací přezku. Nasazené škrtidlo smí sejmout pouze kvalifikovaný zdravotník.

PODÁVÁNÍ ZPRÁV: Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto prostředkem, je nutné nahlásit výrobci (vigilance@safeguardmedical.com) a příslušnému národnímu orgánu.

DANSK

PRODUKTNAVN: TMT – Taktisk mekanisk tourniquet

GENEREL BESKRIVELSE: Den taktiske mekaniske tourniquet (TMT) er en vindstangstourniquet. Anordningen består af en rem med burrebånd og et stift plastikspænde, en modtager, en styreplade og en torsionsstang.

TILSIGTET ANVENDELSE: Den tilsigtede anvendelse af den taktiske mekaniske tourniquet er at kontrollere alvorlige blødninger fra en ekstremitet.

BRUGERPROFIL: TMT er beregnet til brug af både lægfolk og medicinsk uddannede fagfolk.

PATIENTPROFIL: TMT skal anvendes på patienter med alvorlige blødninger fra en ekstremitet.

KONTRAINDIKATIONER: I/R

KLINISKE FORDELE: TMT kontrollerer blødning fra en ekstremitet ved at komprimere den skadede ekstremitet i omkredsen, som minimum (~5 cm over blødningsstedet) til et omfang, hvor der opnås et arterielt okklusivt tryk.

YDEEVNEKARAKTERISTIKA: Anordningen kan udøve et tryk på mindst 200 mmHg.

PRODUKTANPRISNINGER: Anordningen består af en torsionsstang og en låsemekanisme til at styre den arterielle blodgennemstrømning til over- eller underekstremitet. Anordningen bevarer sin effektivitet i hele den tilsigtede brugstid og under patienttransport. Anordningen fås i flere forskellige farver. Anordningens design er egnet til selvanvendelse med én eller to hænder. Anordningen er til engangsbrug og er egnet til anvendelse på en række ekstremitetsomkredse. Anordningen omfatter en dedikeret etiket til registrering af påføringstidspunktet.

RESTRISICI/ADVARSLER: Kun til brug på ekstremitet. Anbefales ikke at bruge i mere end 2 timer. Anvendelse over 2 timer kan potentielt forårsage nerve- eller vævsskader. Risikoen øges, jo længere anordningen anvendes. Anordningen er til engangsbrug. Ved genbrug er der risiko for krydskontaminering og tabt produktfunktionalitet. Ved fjernelse af tourniquet er der risiko for iskæmi-reperfusionsskade/post-tourniquet-syndrom, som kan være skadeligt for ekstremitet og livstruende. Bortskaffes som klinisk affald efter brug. Ved brug efter udløbsdatoen er der risiko for tab af produktets funktionalitet.

BORTSKAFFELSE: Bortskaffes som klinisk affald efter brug.

1.Spænde / **2.** Spændemodtager / **3.** Låsemekanisme / **4.** Torsionsstang / **5.** Fremførerplade / **6.** Rem

Denne anordning er til engangsbrug. Opbevares altid i en håndholdt konfiguration.

BETJENINGSVEJLEDNING TIL ÉN HÅND:

1. Hold enden af remmen ved den hvide tidsmærkningsetiket, og lad TMT'en åbne sig med træksymbolet vendt væk fra dig. Anbringes rundt om den skadede ekstremitet, strømt og højt over såret.

2. Træk i tidsmærkningsetiketten, indtil den øverste rem er adskilt fra den nederste rem.

3. Tag fat i remmen tæt på spændet, træk kraftigt opad, udad og væk fra kroppen, og derefter nedad i en hurtig skraldebevægelse. Gentag trinene, indtil anordningen sidder stramt rundt om ekstremitet.

4. Juster/drej TMT'en på ekstremiteten for at lette adgangen til torsionsstangen. Drej torsionsstangen, indtil blødningen stopper, og der ikke længere er en puls.

5. Lås torsionsstangen fast i låsemekanismen. Fastgør overskydende rem ved at vikle den rundt og trække den ind under dig selv. Skriv tydeligt tidspunktet for påføring på den særlige tidsmærkningsetiket.

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TO HÆNDER:

1. Hold i enden af remmen ved den hvide tidsmærkningsetiket, og fold TMT'en ud. Tag fat i TMT ved spændet, og adskil spændets to dele.

2. Vikl TMT'en rundt om den skadede ekstremitet strømt højt over såret, og sørg for, at anordningen ikke er snoet. Luk spændet.

3. Træk i tidsmærkningsetiketten, indtil den øverste rem er adskilt fra den nederste rem.

4. Tag fat i remmen tæt på spændet, træk kraftigt opad, udad og væk fra kroppen, og derefter nedad i en hurtig skraldebevægelse. Gentag trinene, indtil anordningen sidder stramt rundt om ekstremitet.

5. Juster/drej TMT'en på ekstremiteten for at lette adgangen til torsionsstangen. Drej torsionsstangen, indtil blødningen stopper, og der ikke længere er en puls.

6. Lås torsionsstangen fast i låsemekanismen. Fastgør overskydende rem ved at vikle den rundt og trække den ind under dig selv. Skriv tydeligt tidspunktet for påføring på den særlige tidsmærkningsetiket.

SÅDAN LØSNES/FJERNES TMT:

Fold den overskydende rem ud, påfør et positivt pres på torsionsstangen, pres opad på låsemekanismen, og skub torsionsstangen ud, og åbn derefter spændet. Kun en uddannet læge bør fjerne en tourniquet efter påføring.

INDBERETNING: Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med denne anordning, skal indberettes til producenten (vigilance@safeguardmedical.com) og den relevante nationale kompetente myndighed.

DUTCH

PRODUCTNAAM: TMT – Tactisch Mechanisch Tourniquet

ALGEMENE BESCHRIJVING: Het Tactische Mechanische Tourniquet (TMT) is een liertourniquet. Het hulpmiddel bestaat uit een band met klittenband en een hard plastic gesp, ontvanger, regelplaat en torsiebalk.

BEOOGD GEBRUIK: Het beoogd gebruik van het Tactische Mechanische Tourniquet is het beheersen van ernstige bloeding van een ledemaat.

GEBRUIKERSPROFIEL: Het TMT is bedoeld voor gebruik door zowel leken als medische opgeleide professionals.

PATIËNTPROFIEL: Het TMT moet worden gebruikt op patiënten die ernstig bloeden uit een ledemaat.

CONTRA-INDICATIES: N.v.t.

KLINISCHE VOORDELEN: Het TMT beheerst bloeding uit een ledemaat door de gewonde ledemaat rondom te comprimeren, ten minste (~5 cm boven de plek van de bloeding) tot een mate waarbij arteriële occlusieve druk wordt bereikt.

PRESTATIEKENMERKEN: Hulpmiddel kan ten minste 200 mmHg druk toepassen.

PRODUCTVERKLARINGEN: Hulpmiddel bestaat uit een lier en een vergrendelfunctie voor het comprimeren van de ledemaat. Hulpmiddel behoudt de effectiviteit gedurende de beoogde gebruiksduur en tijdens het transport van de patiënt. Hulpmiddel is in meerdere kleuren verkrijgbaar. Het hulpmiddel is ontworpen om zowel links- als rechtshandig zelf te worden geïnstalleerd. Hulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik, geschikt voor aanbrengen op uiteenlopende omtrekken van ledematen. Hulpmiddel bevat een speciaal label waarop de tijdstip van het aanbrengen kan worden vastgelegd.

RESTRISICO'S / WAARSCHUWINGEN: Uitsluitend voor gebruik op ledematen. Niet aanbevolen om langer dan 2 uur aangebracht te houden. Gebruik langer dan 2 uur veroorzaakt mogelijk zenuw- of weefselschade. Het risico neemt toe met een langere gebruiksduur. Hulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik levert risico van kruisbesmetting en verlies van productfunctionaliteit op. Er bestaat een risico op ischemie-reperfusieletsel/post-tourniquetsyndroom bij verwijdering van het tourniquet, wat bedreigend voor de ledemaat is, evenals levensbedreigend. Na gebruik als klinische afval weggooien. Gebruik na de uiterste houdbaarheidsdatum levert risico van verlies van productfunctionaliteit op.

WEGDOEN: Na gebruik als klinische afval weggooien.

1. Snelvergrendelingsgesp / **2.** Ontvanger van snelvergrendelingsgesp
3. Bevestigingsclip / **4.** Torsiebalk / **5.** Draagplaat / **6.** Band

Dit is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Altijd in eenhandige configuratie bewaren.

INSTRUCTIES VOOR EENHANDIGE BEWERKING:

1. Houd het uiteinde van de band vast aan de tab met het witte tijdslabel, Laat het TMT openvallen met het treksymbool van u af gericht. Plaats het tourniquet rond de gewonde ledemaat, hoog en strak boven de wond.

2. Trek aan de tijdslabeltab totdat de bovenband van de onderband is gescheiden.

3. Pak de band dicht bij de snelvergrendelingsgesp vast, trek de band stevig omhoog, naar buiten en weg van het lichaam, en vervolgens omlaag, in een snelle ratelbeweging. Herhaal deze stap totdat de band stevig rondom de ledemaat zit.

4. Wijzig/draai het TMT op de ledemaat voor gemakkelijke toegang tot de torsiebalk. Verdraai de torsiebalk totdat het bloeden stop en er geen polsslag aanwezig is.

5. Vergrendel de torsiebalk in de vergrendelingsclip. Maak het losse deel van de band vast door hem rondom te wikkelen en onder zichzelf weg te stoppen. Schrijf de tijd van het aanbrengen leesbaar op de speciale tijdstab.

INSTRUCTIES VOOR TWEEHANDIGE BEWERKING:

1. Houd het uiteinde van de band vast aan de tab met het witte tijdslabel, zodat het TMT openvalt. Pak het TMT aan de snelvergrendelingsgesp vast en scheid de twee onderdelen.

2. Wikkel het TMT rondom de gewonde ledemaat, hoog en strak boven de wond, en zorg daarbij dat het hulpmiddel niet wordt verdraaid. Maak de snelvergrendelingsgesp weer vast.

3. Trek aan de tijdslabeltab totdat de bovenband van de onderband is gescheiden.

4. Pak de band dicht bij de snelvergrendelingsgesp vast, trek de band stevig omhoog, naar buiten en weg van het lichaam, en vervolgens omlaag, in een snelle ratelbeweging. Herhaal deze stap totdat de band stevig rondom de ledemaat zit.

5. Wijzig/draai het TMT op de ledemaat voor gemakkelijke toegang tot de torsiebalk. Verdraai de torsiebalk totdat het bloeden stop en er geen polsslag aanwezig is.

6. Vergrendel de torsiebalk in de vergrendelingsclip. Maak het losse deel van de band vast door hem rondom te wikkelen en onder zichzelf weg te stoppen. Schrijf de tijd van het aanbrengen leesbaar op de speciale tijdstab.

HET TMT LOSMAKEN/VERWIJDEREN:

Wikkel het losse deel van de band los, pas positieve druk op de torsiebalk toe, oefen opwaartse druk op de bevestigingsclip uit, druk de torsiebalk naar buiten en ontgrendel dan de snelvergrendelingsgesp. Na het aanbrengen van het tourniquet mag uitsluitend een medisch opgeleide professional het tourniquet verwijderen.

RAPPORTAGE: Een ernstig incident dat is opgetreden met betrekking tot dit hulpmiddel, moet aan de fabrikant (vigilance@safeguardmedical.com) en de toepasselijke nationale bevoegde autoriteit worden gemeld.

FRENCH

NOM DU PRODUIT: TMT – Garrot Tournicat Tactique

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT: Le garrot TMT (en anglais, Tactical Mechanical Tourniquet) est un garrot tournicat. Le dispositif est composé d'une sangle munie d'un crochet, d'une boucle et d'une boucle en plastique rigide, d'un embout pour boucle, d'une plaquette de contrôle et d'une tige de torsion.

UTILISATION PRÉVUE: Le garrot tournicat TMT est destiné à contrôler les hémorragies importantes d'un membre.

PROFIL DE L'UTILISATEUR: TMT est conçu pour être utilisé par des non-initiés et par des professionnels de la santé.

PROFIL DU PATIENT: TMT est indiqué pour une utilisation chez des patients présentant une hémorragie importante d'un membre.

CONTRE-INDICATIONS: Sans objet

BÉNÉFICES CLINIQUES: TMT permet de contrôler le saignement d'une extrémité en réalisant une compression circonférentielle du membre blessé (environ 5 cm en amont du site hémorragique), au moins jusqu'à l'obtention d'une pression d'occlusion artérielle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Le dispositif est capable d'exercer une pression d'au moins 200 mmHg.

REVENDICATIONS DU PRODUIT: La fonctionnalité tourniquet du garrot permet de contrôler de débit sanguin artériel dans les extrémités inférieures ou supérieures. L'efficacité du dispositif est maintenue pendant toute la durée d'utilisation prévue et pendant le transport du patient. Le dispositif est disponible en plusieurs coloris. La conception du dispositif convient à une application à soi-même, à une ou deux mains. Le dispositif est destiné à un usage unique et convient à une multitude de circonférences des membres. Le dispositif est muni d'une étiquette permettant d'indiquer l'heure de pose.

RISQUES RÉSIDUELS / MISES EN GARDE: Pour une application sur les membres uniquement. La mise en place du garrot ne doit pas excéder 2 heures. Une durée d'utilisation supérieure à 2 heures pourrait causer des lésions nerveuses ou tissulaires. Ce risque s'amplifie avec la durée de pose du garrot. Le dispositif est destiné à un usage unique. La réutilisation implique un risque d'infection croisée et de perte de fonctionnalité du produit. Lors du retrait du garrot tournicat, il existe un risque de syndrome d'ischémie-reperfusion/syndrome de compression susceptible de menacer le membre et d'engager le pronostic vital. Veuillez éliminer avec les déchets cliniques après utilisation. L'utilisation au-delà de la date de péremption impliquera un risque de perte de fonctionnalité du produit.

ÉLIMINATION: Veuillez éliminer avec les déchets cliniques après utilisation.

1. Boucle rapide / **2.** Embout pour la boucle rapide / **3.** Crochet de verrouillage / **4.** Tige de torsion / **5.** Plaquette de contrôle **6.** Sangle

Le dispositif est destiné à un usage unique. Veillez à toujours conserver le produit dans sa configuration pour une utilisation à une main.

MODE D'EMPLOI POUR UNE APPLICATION À UNE MAIN:

1. Tenez la sangle du côté de l'étiquette blanche conçue pour indiquer l'heure de pose, laissez le TNT se déployer, le symbole « Tirer » (Pull) vers l'extérieur. Placez et serrez le garrot autour du membre blessé, en amont de la blessure.

2. Tirez sur la languette avec l'étiquette conçue pour indiquer le temps de pose jusqu'à ce que la sangle supérieure soit séparée de la sangle inférieure.

3. Attrapez la sangle à proximité de la boucle rapide. D'un mouvement rapide, tirez fermement vers le haut, puis dans la direction opposée du corps, et ensuite vers le bas, comme si vous utilisiez un cliquet. Répétez cette étape jusqu'à ce que le garrot soit bien serré autour du membre.

4. Ajustez ou faites tourner le TMT autour du membre jusqu'à l'obtention d'un accès rapide à la tige de torsion. Tournez la tige de torsion jusqu'à ce que l'hémorragie s'arrête et que vous ne sentiez plus le pouls.

5. Placez la tige de torsion dans son crochet de verrouillage. Enroulez l'excédent de sangle autour de votre membre et maintenez-la en la repliant sous le garrot. Indiquez l'heure de pose sur l'étiquette prévue à cet effet en vous assurant que votre écriture soit lisible.

MODE D'EMPLOI POUR UNE APPLICATION À DEUX MAINS:

1. Tenez la sangle du côté de l'étiquette blanche conçue pour indiquer l'heure de pose et laissez le TNT se déployer. Attrapez le TNT par la boucle rapide et séparez le garrot en deux.

2. Enroulez et serrez le TNT autour du membre blessé en amont de la blessure, en vous assurant que la sangle n'est pas tordue. Attachez la boucle rapide.

3. Tirez sur la languette avec l'étiquette conçue pour indiquer le temps de pose jusqu'à ce que la sangle supérieure soit séparée de la sangle inférieure.

4. Attrapez la sangle à proximité de la boucle rapide. En un mouvement rapide, tirez fermement vers le haut, puis dans la direction opposée du corps, et ensuite vers le bas, comme si vous utilisiez un cliquet. Répétez cette étape jusqu'à ce que le garrot soit bien serré autour du membre.

5. Ajustez ou faites tourner le TMT autour du membre jusqu'à l'obtention d'un accès rapide à la tige de torsion. Tournez la tige de torsion jusqu'à ce que l'hémorragie s'arrête et que vous ne sentiez plus le pouls.

6. Placez la tige de torsion dans son crochet de verrouillage. Enroulez l'excédent de sangle autour de votre membre et maintenez-la en la repliant sous le garrot. Indiquez l'heure de pose sur l'étiquette prévue à cet effet en vous assurant que votre écriture soit lisible.

POUR LIBÉRER / ENLEVER LE TMT:

Déroulez l'excédent de sangle et exercez une pression positive sur la tige de torsion. Exercez une pression vers le haut sur le crochet de verrouillage et décoincez la tige de torsion. Desserrez la boucle rapide. Une fois appliqué, seul un professionnel de la santé qualifié est autorisé à retirer le garrot.

SIGNALEMENT: Tout incident grave en lien avec ce dispositif doit être signalé au fabricant (vigilance@safeguardmedical.com) et aux autorités compétentes nationales pertinentes.

GERMAN

PRODUKTBEZEICHNUNG: TMT – Taktisches Mechanisches Tourniquet

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG: Das taktische mechanische tourniquet (tmt) ist ein winden-tourniquet das gerät besteht aus einem gurt mit klettverschluss und einer festen plastikschnalle, empfänger, steuerplatte und drehbalken.

ANWENDUNGSGEBIET: Der vorgesehene verwendungszweck des taktischen mechanischen tourniquets ist die kontrolle starker blutungen an gliedmaßen.

ANWENDERPROFIL: Das tmt kann sowohl von laien als auch von medizinisch ausgebildeten personen verwendet werden.

PATIENTENPROFIL: Das tmt ist zur verwendung bei patienten mit starken blutungen an gliedmaßen gedacht.

GEGENANZEIGEN: k. A.

KLINISCHE VORTEILE: Das tmt kontrolliert die blutung an einer extremität, indem es die verletzte extremität mindestens (~5 cm über der blutungsstelle) so weit komprimiert, dass ein arterieller verschlussdruck erreicht wird.

LEISTUNGSMERKMALE: Das gerät kann einen druck von mindestens 200 mmhg ausüben.

PRODUKTANSPRÜCHE: Das gerät verfügt über eine winde und eine verriegelungsfunktion zur kontrolle des arteriellen blutflusses in den oberen und unteren extremitäten. Das gerät behält seine wirksamkeit während des gesamten vorgesehenen anwendungszeitraums und während des patiententransports bei. Das gerät ist in verschiedenen farben erhältlich. Das design des geräts ist für die ein- oder zweihändige selbstanwendung geeignet. Das gerät ist für den einmaligen gebrauch bestimmt und eignet sich für eine reihe von gliedmaßenumfängen. Das gerät enthält ein spezielles etikett zur aufzeichnung der anwendungszeitpunkts.

RESTRISIKEN / WARNUNGEN: Nur zur verwendung an gliedmaßen. Das produkt sollte nicht länger als 2 stunden an einer stelle getragen werden. Eine verwendung für mehr als 2 stunden kann zu nerven- oder gewebeschäden führen. Je länger das gerät verwendet wird, desto höher ist das risiko. Das produkt ist ausschließlich für die einmalverwendung vorgesehen. Eine wiederverwendung kann zu verunreinigungen führen und die funktionalität des produktes beeinträchtigen. Es besteht das risiko eines reperfusionsschadens/tourniquet-syndroms nach der entfernung des tourniquets, was die gliedmaßen gefährden kann und lebensbedrohlich sein kann. Das produkt ist nach der verwendung als klinischer abfall zu entsorgen. Eine verwendung nach dem verfallsdatum kann zum verlust der produktfunktionalität führen.

ENTSORGUNG: Das produkt ist nach der verwendung als klinischer abfall zu entsorgen.

1. Schnellverschlussschnalle / **2.** Schnellverschlusschnallenaufnehmer / **3.** Halteclip / **4.** Drehbalken / **5.** Trägplatte / **6.** Gurt

Zur einmaligen Verwendung. Immer in der einhändigen Konfiguration lagern.

ANLEITUNG FÜR DEN EINHÄNDIGEN GEBRAUCH:

1. Halten sie das ende des gurts an der seite mit dem weißen schild für die zeitangabe. Geben sie dem tmt kurz zeit, sich zu entfalten. Das ziehen-symbol zeigt dabei von ihnen weg. Legen sie das tourniquet oberhalb der wunde fest um den extremität, dass sie gut an dem drehbalken herumkommen. Drehen sie den drehbalken, bis die dilation gestoppt ist und kein puls mehr fühlbar ist.

2. Ziehen sie an dem schild für die zeitangabe, bis der obere gurt von dem unteren gurt getrennt ist.

3. Greifen sie den gurt in der nähe schnellverschlussschnalle, ziehen sie sie in einer schnellen ratschbewegung fest nach oben und

SKILGREINDIR NOTENDUR: TMT er ætlaður til notkunar jafnt af leikmönnum sem og af menntuðum heilbrigðisstarfsmönnum.

SKILGREINDIR SJÚKLINGAR: TMT á að nota á sjúklinga með alvarlegar blæðingar frá útlimum.

FRÁBENDINGAR: Á ekki við

KLÍNÍSKUR ÁVINNINGUR: TMT stjórnar blæðingu frá útlim með því að þrýsta allan hringinn um útlimaðgerðina, (~5 cm fyrir ofan sárið) í það minnsta þar til lokaðum slagæðarþrýstingi er náð.

FRAMMISTÖÐUEIGINLEIKAR: Tækið getur beitt að minnsta kosti 200 mmHg þrýstingi.

KRÖFUR SEM VARAN UPPFYLLIR: Tækið samanstendur af vindu og læsingareiginleika til að stjórna blóðflæði í slagæðum til efri og neðri útlima. Tækið viðheldur virkni allan fyrirhugaðan notkunartíma þess og meðan á flutningi sjúklings stendur. Tækið er fáanlegt í mörgum litum Hönnun tækisins hentar fyrir einnar eða tveggja handa sjálfsnotkun. Tækið er einnota, hentugt til notkunar fyrir margs konar umnál útlima. Tækið inniheldur sérstakt merki fyrir skráningartíma beitingar.

EFTIRSTÆÐIR ÁHÆTTUÞÆTTIR / VIÐVARANIR: Engöngu fyrir not á limi. Ekki er mælt með að það sé notað lengur en í 2 klukkustundir. Notkun lengur en í 2 klst. mun hugsanlega valda tauga- eða vefjaskemmdum. Hættan eykst með lengri notkunartíma. Búnaðurinn er einngöngu einnota. Endurnotkun getur valdið virksmitun og því að búnaðurinn virki ekki lengur sem skyldi. Hætta er á meiðslum vegna blóðþurrðar-endurflæðis/snarvönduls-heilkenni sem getur átt sér stað þegar snarvöndullinn er fjarlægður. Slíkt getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir útlim og lífshættulegt. Fargið sem klínískum úrgangi eftir notkun. Notkun eftir fyrningardagsetningu getur orðið til þess að varan virki ekki.

FÖRGUN: Fargið sem klínískum úrgangi eftir notkun.

1. Hraðsylgja / **2.** Hraðsylgjumóttakari / **3.** Festiklemma
4. Vindustöng / **5.** Burðarplata / **6.** Ól

Þetta er einnota tæki. Geymið ávallt í einnar handar stöðu.

LEIÐBEININGAR FYRIR EINNAR HANDAR NOTKUN:

1. Haltu um enda ólarinnar við hvíta tímamiðaflipann, leyfðu TMT að opnast með togkrókinn frá þér. Setu TMT utan um slasaða útlimnin hátt og þétt fyrir ofan sárið.

2. Togaðu í tímamerkisflipann þar til efri óln er aðskilin frá neðri óinni.

3. Gríptu um ólina nálægt hraðsylgjunni, dragðu þétt upp, út og frá líkamanum og síðan niður, með snöggri skrallhreyfingu. Endurtaktu skref3 þar til hún er þétt um útliminn.

4. Stilltu/snúðu TMT á útimunn til að auðvelda aðgang að vindustöngi-nni. Snúðu vindustönginni þar til blæðing stöðvast og púls er ekki til staðar.

5. Læstu vindustönginni í festiklemmuna. Festu ólina sem er umfram með því að vefja henni um limin og undir sjálfa sig. Skrifaðu ásetningartíma læsilega á tímaflipann.

LEIÐBEININGAR FYRIR TVEGGJA HANDA NOTKUN:

1. Haltu um enda ólarinnar við hvíta tímamiðaflipann, leyfðu TMT að opnast. Gríptu um TMT í hraðsylgjuna og afskiðið lausana tvo.

2. Vefðu TMT utan um slasaða útlimin hátt og þétt fyrir ofan sárið og gakktu úr skugga um að búnaðurinn sé ekki snúinn. Tengdu hraðsylgjuna aftur.

3. Togaðu í tímamerkisflipann þar til efri óln er aðskilin frá neðri óinni.

4. Gríptu um ólina nálægt hraðsylgjunni, dragðu þétt upp, út og frá líkamanum og síðan niður, með snöggri skrallhreyfingu. Endurtaktu skref4 þar til hún er þétt um útlimin.

5. Stilltu/snúðu TMT á útimunn til að auðvelda aðgang að vindustöng-inni. Snúðu vindustönginni þar til blæðing stöðvast og púls er ekki til staðar.

6. Læstu vindustönginni í festiklemmuna. Festu ólina sem er umfram með því að vefja henni um limin og undir sjálfa sig. Skrifaðu ásetningartíma læsilega á tímaflipann.

TIL AÐ LOSA/TAKA AF TMT:

Festu ólina sem er umfram, settu þrýsting á vindustöngina, beittu þrýstingi upp á við á festiklemmuna, stýru vindustönginni út, og aflæstu síðan hraðsylgjunni. Aðeins fagfærðir heilbrigðisstarfsmenn skulu fjarlægja vöndulinn þegar hann hefur verið settur á.

SKÝRSLUGJÖF: Öll alvarleg tilvik sem koma upp við notkun þessa búnaðar skal tilkynna til framleiðanda (vigilance@safeguardmedical.com) og lögmætra eftirlitsyfirvalda.

NOME PRODOTTO: TMT –Laccio emostatico meccanico tattico

DESCRIZIONE GENERALE: Il laccio emostatico meccanico tattico (TMT) è un laccio emostatico militare. Il dispositivo è composto da una cinghia con velcro e fibbia in plastica rigida, leva, targhetta e barra di torsione.

USO PREVISTO: L'uso previsto del laccio emostatico meccanico tattico è il controllo del sanguinamento grave di un arto.

PROFILO UTENTE: Il TMT è progettato per l'uso da parte sia di persone senza una formazione medica sia di professionisti sanitari.

PROFILO PAZIENTE: Il TMT deve essere utilizzato su pazienti con sanguinamento grave di un arto.

CONTROINDICAZIONI: N/D

BENEFICI CLINICI: Il TMT controlla il sanguinamento di un'estremità tramite la compressione circonferenziale dell'arto leso, almeno (~5 cm sopra il sito di sanguinamento) fino a raggiungere la pressione arteriosa occlusiva.

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI: Il dispositivo è in grado di applicare una pressione di almeno 200 mmHg.

ARGOMENTI A FAVORE DEL PRODOTTO: Il dispositivo presenta una funzione ad argano e di blocco per controllare il flusso di sangue arterioso alle estremità superiori e inferiori. Il dispositivo mantiene la sua efficacia per tutta la durata prevista di utilizzo e durante il trasporto del paziente. Il dispositivo è disponibile in vari colori. Il dispositivo ha un design che consente l'autoapplicazione con una o due mani. Il dispositivo è monouso, adatto all'applicazione su arti di varie circonferenze. Il dispositivo comprende un'etichetta specifica sulla quale registrare l'ora dell'applicazione.

RISCHI RESIDUI / AVVERTENZE: Da utilizzare solo sugli arti. Si sconsiglia l'applicazione per più di 2 ore. L'uso superiore a 2 ore può provocare danni a nervi o tessuti. Il rischio è maggiore con un'applicazione più prolungata. Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo implica il rischio di contaminazione crociata e perdita di funzionalità del prodotto. Esiste il rischio di danno da ischemia-riperfusione/sindrome da laccio emostatico quando si rimuove il laccio, situazione che mette in pericolo l'incolumità dell'arto e la vita del paziente. Smaltire come rifiuto clinico dopo l'uso. L'uso dopo la data di scadenza implica il rischio di perdita di funzionalità del prodotto.

SMALTIMENTO: Smaltire come rifiuto clinico dopo l'uso.

1. Fibbia / **2.** Leva della fibbia / **3.** Morsetto di fissaggio / **4.** Barra di torsione / **5.** Targhetta / **6.** Cinghia

Dispositivo monouso. Conservare sempre nella configurazione per l'uso con una mano.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO CON UNA MANO:

1. Afferrare l'estremità della cinghia tenendola dalla linguetta con l'etichetta dell'orario bianca, attendere che il TMT si apra con il simbolo "tirare" rivolto verso di sé. Avvolgere attorno all'arto ferito, in alto, e stringere attorno alla ferita.

2. Tirare la linguetta dell'etichetta dell'orario finché la cinghia superiore non si separa dalla cinghia inferiore.

3. Stringere la cinghia vicino alla fibbia, tirarla con forza verso l'alto, l'esterno e lontano dal corpo, quindi verso il basso, con un movimento rapido e a cricchetto. Ripetere questa operazione finché non è ben aderente all'arto.

4. Regolare/ruotare il TMT sull'arto per accedere agevolmente alla barra di torsione. Girare la barra di torsione finché il sanguinamento non si arresta e non si avverte più la pulsazione.

5. Bloccare la barra di torsione nel morsetto di fissaggio. Fissare la cinghia in eccesso arrotolandola e ripiegandola su se stessa. Annotare in modo leggibile l'ora di applicazione sulla linguetta dell'ora.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO CON DUE MANI:

1. Afferrare l'estremità della cinghia tenendola dalla linguetta con l'etichetta dell'orario bianca, attendere che il TMT si apra. Afferrare il TMT tenendolo dalla fibbia e separare le due sezioni.

2. Avvolgere il TMT attorno all'arto ferito, in alto, stringere attorno alla ferita e controllare che il dispositivo non si attorcigli. Ricollegare la fibbia.

3. Tirare la linguetta dell'etichetta dell'orario finché la cinghia superiore non si separa dalla cinghia inferiore.

4. Stringere la cinghia vicino alla fibbia, tirarla con forza verso l'alto, l'esterno e lontano dal corpo, quindi verso il basso, con un movimento rapido e a cricchetto. Ripetere questa operazione finché non è ben aderente all'arto.

5. Regolare/ruotare il TMT sull'arto per accedere agevolmente alla barra di torsione. Girare la barra di torsione finché il sanguinamento non si arresta e non si avverte più la pulsazione.

6. Bloccare la barra di torsione nel morsetto di fissaggio. Fissare la cinghia in eccesso arrotolandola e ripiegandola su se stessa. Annotare in modo leggibile l'ora di applicazione sulla linguetta dell'ora.

APRIRE / RIMUOVERE IL TMT:

Eliminare la cinghia in eccesso, esercitare una pressione positiva sulla barra di torsione, applicare una pressione verso l'alto sul morsetto di fissaggio e spingere la barra di torsione verso l'esterno, quindi aprire la fibbia. Dopo averlo applicato, il laccio emostatico deve essere rimosso esclusivamente da un operatore sanitario.

SEGNALAZIONE: Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere comunicati al produttore (vigilance@safeguardmedical.com) e all'autorità nazionale competente.

PRODUKTNAVN: TMT – Tactical Mechanical Tourniquet (taktisk mekanisk turniké)

GENERELL BESKRIVELSE: Tactical Mechanical Tourniquet (TMT) er et turniké med ankerspill. Enheten består av en stropp med krok og løkke og en spennemekanisme. Enheten består av stropp, mottaker, kontrollplate og torsjonsstang.

TILTENKT BRUK: Den tiltenkte bruken av Tactical Mechanical Tourniquet er å kontrollere alvorlig blødning fra et lem.

BRUKERPROFIL: TMT er beregnet til bruk av både sivilpersoner uten medisinsk opplæring og medisinsk opplært faggruppe.

PASIENTPROFIL: TMT er utformet til bruk på pasienter med alvorlig blødning fra et lem.

KONTRAINDIKASJONER: Ikke relevant

KLINISKE FORDELER: TMT kontrollerer blødning fra en ekstremitet ved å gi sirkumferensjon rundt omkretsen av det skadde lemmet, minst (~5 cm over blødningsstedet) til arterielt okklusjonstrykk er oppnådd.

YTELSESEGENSKAPER: Enheten kan påføre minst 200 mmHg trykk.

PRODUKTPÅSTANDER: Enheten består av et ankerspill og låsefunksjon for å kontrollere arteriell blodstrøm til øvre og nedre ekstremiteter. Enheten opprettholder effekt gjennom tiltenkt varighet av bruk og under pasienttransport. Enheten er tilgjengelig i flere farger Utformingen av enheten er egnet for en- eller tohånds selvpåføring. Enheten er til engangsbruk, egnet for bruk på en rekke lemmer. Enheten inkluderer dedikert etikett for å registrere tidspunktet av påføringen.

ØVRIGE RISIKOER / ADVARSLER: Kun til bruk på lemmer. Bruk i mer enn to timer anbefales ikke. Bruk utover 2 timer vil potensielt forårsake nerve- eller vevsskader.Risikoen øker med lengre påføringstid. Enheten er til engangsbruk. Gjenbruk medfører risiko for krysskontaminering og produktets funksjonalitet. Det er en risiko for iskemi-reperfusjonsskade/post-turniké-syndrom ved fjerning av turniketen, noe som kan sette lemmet i fare og kan være livstruende. Kasseres som klinisk avfall etter bruk. Bruk etter utløpsdatoen utgjør en risiko for tap av funksjonalitet.

AVHENDING: Kasseres som klinisk avfall etter bruk.

1. Fartsspenne / **2.** Fartsspennmottaker / **3.** Låseklemme
4. Torsjonsstang / **5.** Bæreplate / **6.** Stropp

Dette er en enhet for engangsbruk. Oppbevar alltid i enhåndskonfigurasjon.

BRUKSANVISNING MED ÉN HÅND:

1. Hold enden av stroppen i den hvite tidsetikettfanen, la TMT falle åpen med trekk-symbolet vendt bort fra deg. Plasser rundt det skadede ekstremitetet, høyt og tett over såret.

2. Trekk i tidsetikettfanen til den øvre stroppen er separert fra den nedre stroppen.

3. Grip stroppen nær fartsspennen, trekk godt opp, ut og bort fra kroppen, og deretter nedover, i en rask sperrebevegelse. Gjenta trinnet til den sitter tett rundt ekstremiteten.

4. Juster/roter TMT på ekstremiteten for enkel tilgang til torsjonsstangen. Vri torsjonsstangen til blødningen stopper og pulsen ikke er tilstede.

5. Lås torsjonsstangen inn i låseklemmen. Sikre overflødig stropp ved å vikle rundt og legge den under seg selv. Skriv påføringspunktet på en leselig måte på den dedikerte tidsfanen.

BRUKSANVISNING MED TO HENDER:

1. Hold enden av stroppen i den hvite tidsetikettfanen, la TMT falle åpen. Ta TMT i fartsspennen og del de to seksjonene.

2. Pakk TMT rundt den skadde ekstremiteten høyt og tett over såret, og sørg for at enheten ikke er vridd. Koble til fartsspennen igjen.

3. Trekk i tidsetikettfanen til den øvre stroppen er separert fra den nedre stroppen.

4. Grip stroppen nær fartsspennen, trekk godt opp, ut og bort fra kroppen, og deretter nedover, i en rask sperrebevegelse. Gjenta trinnet til den sitter tett rundt ekstremiteten.

5. Juster/roter TMT på ekstremiteten for enkel tilgang til torsjonsstangen. Vri torsjonsstangen til blødningen stopper og pulsen ikke er tilstede.

6. Lås torsjonsstangen inn i låseklemmen. Sikre overflødig stropp ved å vikle rundt og legge den under seg selv. Skriv påføringspunktet på en leselig måte på den dedikerte tidsfanen.

BRUKSANVISNING MED TRE HENDER:

1. Hold enden av stroppen i den hvite tidsetikettfanen, la TMT falle åpen. Ta TMT i fartsspennen og del de to seksjonene.

2. Pakk TMT rundt den skadde ekstremiteten høyt og tett over såret, og sørg for at enheten ikke er vridd. Koble til fartsspennen igjen.

3. Trekk i tidsetikettfanen til den øvre stroppen er separert fra den nedre stroppen.

4. Grip stroppen nær fartsspennen, trekk godt opp, ut og bort fra kroppen, og deretter nedover, i en rask sperrebevegelse. Gjenta trinnet til den sitter tett rundt ekstremiteten.

5. Juster/roter TMT på ekstremiteten for enkel tilgang til torsjonsstangen. Vri torsjonsstangen til blødningen stopper og pulsen ikke er tilstede.

6. Lås torsjonsstangen inn i låseklemmen. Sikre overflødig stropp ved å vikle rundt og legge den under seg selv. Skriv påføringspunktet på en leselig måte på den dedikerte tidsfanen.

7. Trekk i tidsetikettfanen til den øvre stroppen er separert fra den nedre stroppen.

8. Grip stroppen nær fartsspennen, trekk godt opp, ut og bort fra kroppen, og deretter nedover, i en rask sperrebevegelse. Gjenta trinnet til den sitter tett rundt ekstremiteten.

9. Juster/roter TMT på ekstremiteten for enkel tilgang til torsjonsstangen. Vri torsjonsstangen til blødningen stopper og pulsen ikke er tilstede.

10. Lås torsjonsstangen inn i låseklemmen. Sikre overflødig stropp ved å vikle rundt og legge den under seg selv. Skriv påføringspunktet på en leselig måte på den dedikerte tidsfanen.

BRUKSANVISNING MED TO HENDER:

1. Hold enden av stroppen i den hvite tidsetikettfanen, la TMT falle åpen. Ta TMT i fartsspennen og del de to seksjonene.

2. Pakk TMT rundt den skadde ekstremiteten høyt og tett over såret, og sørg for at enheten ikke er vridd. Koble til fartsspennen igjen.

PORTUGUESE

NOME DO PRODUTO: TMT – Torniquete Mecânico Tático

DESCRIÇÃO GERAL: O Torniquete Mecânico Tático (TMT) é um torniquete de guincho. O dispositivo consistem numa alça com velcro e uma fivela de plástico rígido, fecho, placa de controlo e barra de torção.

UTILIZAÇÃO PREVISTA: A utilização prevista do Torniquete Mecânico Tático é para controlar a hemorragia grave de um membro.

PERFIL DO UTILIZADOR: O TMT destina-se a ser utilizado quer por leigos, quer por profissionais com formação médica.

PERFIL DO PACIENTE: O TMT deve ser utilizado em pacientes com hemorragia grave de um membro.

CONTRAINDICAÇÕES: N/D

BENEFÍCIOS CLÍNICOS: O TMT controla hemorragias de uma extremidade através da compressão circunferencial do membro ferido, pelo menos (~5 cm acima do local da hemorragia) até que a pressão arterial oclusiva seja alcançada.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO: O dispositivo pode aplicar pelo menos 200 mmHg de pressão.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO: O dispositivo é composto por um guincho e uma funcionalidade de bloqueio para controlar o fluxo sanguíneo arterial nos membros inferiores e superiores. O dispositivo mantém a eficácia durante toda a duração pretendida de utilização e durante o transporte do paciente. O dispositivo está disponível em várias cores. O design do dispositivo é adequado para a autoaplicação com uma ou duas mãos. O dispositivo destina-se a uma única utilização, adequado para a aplicação numa variedade de circunferências de membros. O dispositivo inclui uma etiqueta específica para registar a hora de aplicação.

RISCOS RESIDUAIS / AVISOS: Para utilizar apenas nos membros. Não é recomendada que fique colocado por mais de 2 horas. A utilização além das 2 horas pode causar danos nos nervos ou tecidos. O risco aumenta com um tempo de aplicação mais longo. O dispositivo destina-se a uma única utilização. A reutilização pode resultar em contaminação cruzada e perda de funcionalidade do produto. Há um risco de uma lesão de isquemia-reperfusão/síndrome de pós-torniquete na remoção do torniquete, que pode levar à perda do membro ou mesmo ser fatal. Descartar como lixo hospitalar, depois da utilização. A utilização após a data de validade resulta na perda de funcionalidade do produto.

ELIMINAÇÃO: Descartar como lixo hospitalar, depois da utilização.

1. Fivela de aperto rápido / **2.** Fecho de fivela de aperto rápido
3. Clipe de retenção / **4.** Barra de torção / **5.** Placa de transporte
6. Alça

Este é um dispositivo de utilização única. Guarde sempre com a configuração de uma mão.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO COM UMA MÃO:

1. Segure a extremidade da alça pela aba branca da etiqueta para anotar a hora, deixe o TMT abrir sozinho com o símbolo PULL virado na direção oposta a si. Coloque em volta do membro ferido, acima e ajustado acima da ferida.

2. Puxe a aba da etiqueta para anotar a hora até que a alça superior fique separada da alça inferior.

3. Segure a alça próximo da fivela de aperto rápido, puxe firmemente para cima, para fora e para longe do corpo, e depois para baixo, num movimento de aperto rápido. Repita o passo até ficar ajustado e confortável em torno da extremidade.

4. Ajuste/rode o TMT na extremidade para facilitar o acesso à barra de torção. Torça a barra de torção até que a hemorragia pare e não haja pulsação.

5. Fixe a barra de torção no clipe de retenção. Prenda o excesso de alça enrolando-a e metendo-a por baixo dela mesma. Escreva de forma legível a hora de aplicação na aba específica para anotar a hora.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO COM DUAS MÃOS:

1. Segure a extremidade da alça pela aba branca da etiqueta para anotar a hora, deixe o TMT abrir sozinho. Agarre o TMT pela fivela de aperto rápido e separe as suas secções.

2. Enrole o TMT em torno do membro ferido, acima e ajustado acima da ferida, garantindo que o dispositivo não fica torcido. Volte a encaixar a fivela de aperto rápido.

3. Puxe a aba da etiqueta para anotar a hora até que a alça superior fique separada da alça inferior.

4. Segure a alça próximo da fivela de aperto rápido, puxe firmemente para cima, para fora e para longe do corpo, e depois para baixo, num movimento de aperto rápido. Repita o passo até ficar ajustado e confortável em torno da extremidade.

5. Ajuste/rode o TMT na extremidade para facilitar o acesso à barra de torção. Torça a barra de torção até que a hemorragia pare e não haja pulsação.

6. Trave a barra de torção no clipe de retenção. Prenda o excesso de alça enrolando-a e metendo-a por baixo dela mesma. Escreva de forma legível a hora de aplicação na aba específica para anotar a hora.

PARA SOLTAR / RETIRAR O TMT:

Abra a alça em excesso, coloque pressão positiva na barra de torção, aplique pressão para cima no clipe de retenção e empurre a barra de torção para fora, e depois destrave a fivela de aperto rápido. Apenas um profissional com formação médica deve remover o torniquete depois de aplicado.

COMUNICAR: Qualquer incidente grave que ocorra relacionado com este dispositivo deve ser relatado ao fabricante (vigilance@safeguardmedical.com) e à autoridade competente nacional.

SLOVAK

NÁZOV VÝROBKU: TMT – Taktické mechanické škrtidlo

VŠEOBECNÝ POPIS: Taktické mechanické škrtidlo (TMT) je škrtidlo s navíjadlom. Táto pomôcka sa skladá z popruhu so suchým zipsom a pevnej plastovej spony, zapínača, ovládacej platne a torznej tyče.

ÚČEL POUŽITIA: Účel použitia taktického mechanického škrtidla je na zastavenie krvácania v končatine.

PROFIL POUŽÍVATEĽA: TMT je určené na použitie laikmi, ako aj zdravotníckymi profesionálmi.

PROFIL PACIENTA: TMT je navrhnuté ako živý zachraňujúca pomôcka u pacientov s vážnym krvácaním z končatiny.

KONTRAINDIKÁCIE: neuvedené

KLINICKÉ VÝHODY: Škrtidlo TMT zastavuje krvácanie z končatín tak, že stlačí obvod zranenej končatiny, minimálne (~5 cm nad miestom krvácania) do takej miery, kedy sa dosiahne okluzívny tlak na artériu.

CHARAKTERISTIKY ÚČINKU: Pomôcka dokáže vyvinúť tlak minimálne 200 mmHg.

CHARAKTERISTIKY VÝROBKU: Pomôcka obsahuje navíjadlo a má zamykaciu funkciu na ovládanie prietoku arteriálnej krvi do horných a dolných končatín. Pomôcka si zachováva efektívnosť počas zamýšľanej doby použitia a počas prepravy pacienta. Pomôcka je dostupná vo viacerých farbách. Tvar pomôcky je vhodný na jednoručné aj obojručné nasadenie samotným pacientom. Pomôcke je určená na jednorazové použitie na rôznych obvodoch končatín. Na pomôcke je špeciálny štítok na zaznamenanie času nasadenia.

ZVYŠKOVÉ RIZIKÁ / VAROVANIA: Len na použitie na končatinách. Neodporúča sa ponechať na mieste dlhšie ako 2 hodiny. Použitie dlhšie ako 2 hodiny môže spôsobiť poškodenie nervov alebo tkanice. Riziko sa zvyšuje s dlhším časom použitia. Pomôcka je určená na jednorazové použitie. Opätovné použitie predstavuje riziko skríženej kontaminácie a straty funkčnosti výrobku. Existuje riziko ischemicko-reperfúzneho zranenia/post-turniketového syndrómu pri zložení škrtidla, ktorý ohrozuje končatinu a život. Po použití zneškodnite ako klinický odpad. Použitie po dátume exspirácie predstavuje riziko straty funkčnosti výrobku.

LIKVIDÁCIA: Po použití zneškodnite ako klinický odpad.

1. Spona / **2.** Zapínacia časť spony / **3.** Pridržiavací klip / **4.** Torzná tyčka / **5.** Nosná doska / **6.** Popruh

Táto pomôcka je určená na jedno použitie. Vždy skladujte v jednoručnej konfigurácii.

NÁVOD NA JEDNORUČNÉ POUŽITIE:

1. Podržte koniec popruhu za biely štítok na zaznamenanie času, nechajte, aby sa TMT rozložil tak, aby symbol potiahnutia smeroval od vás. Škrtidlo nasaďte na zranenú končatinu dostatočne vysoko nad ranu a utiahnite ho.

2. Ťahajte za štítok, kým sa horný popruh neoddelí od dolného.

3. Chyťte popruh blízko spony, pevne ho potiahnite smerom von a preč od tela a potom smerom nadol rýchlym trhavým pohybom. Tento krok opakujte, kým nie je škrtidlo pevne utiahnuté okolo končatiny.

4. Upravte/otáčajte škrtidlom TMT na končatine, aby bol prístup k torznej tyče jednoduchý. Torznou tyčkou otáčajte, kým sa krvácanie nezastaví a nie je pritomný pulz.

5. Torznú tyčku zaistite do pridržiavacieho klipu. Nadbytočný popruh obtočte okolo a zastrčte. Čitateľne zaznačte čas nasadenia na špeciálny štítok.

NÁVOD NA OBOJRUČNÉ POUŽITIE:

1. Podržte koniec popruhu za biely štítok na zaznamenanie času, nechajte, aby sa TMT rozložil. Chyťte TMT za sponu a rozopnite jej dve časti.

2. Obtočte TMT okolo zranenej končatiny dostatočne vysoko nad ranu a utiahnite ho tak, aby sa neotáčal. Znova spojte sponu.

3. Ťahajte za štítok, kým sa horný popruh neoddelí od dolného.

4. Chyťte popruh blízko spony, pevne ho potiahnite smerom von a preč od tela a potom smerom nadol rýchlym trhavým pohybom. Tento krok opakujte, kým nie je škrtidlo pevne utiahnuté okolo končatiny.

5. Upravte/otáčajte škrtidlom TMT na končatine, aby bol prístup k torznej tyče jednoduchý. Torznou tyčkou otáčajte, kým sa krvácanie nezastaví a nie je pritomný pulz.

6. Torznú tyčku zaistite do pridržiavacieho klipu. Nadbytočný popruh obtočte okolo a zastrčte. Čitateľne zaznačte čas nasadenia na špeciálny štítok.

UVOLNENIE / ZLOŽENIE TMT:

Odvíňte nadbytočný popruh, na torznú tyčku vyvíňte pretlak, zatlačte pridržiavací klip nahor a zatlačte torznú tyčku smerom von a potom odistite sponu. Škrtidlo smie po jeho nasadení zložiť len školený zdravotnícky pracovník.

NAHLASOVANIE: Každý závažný incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s touto pomôckou, sa musí nahlásiť výrobcovi (vigilance@safeguard-medical.com) a príslušnému kompetentnému vnútroštátnemu orgánu.

SPANISH

NOMBRE DEL PRODUCTO: TMT – Torniquete mecánico táctico

DESCRIPCIÓN GENERAL: El torniquete mecánico táctico (TMT) es un torniquete con vara para ajustar la presión. El dispositivo consta de una correa con velcro y una hebilla de plástico rígido, un receptor, una placa de control y una barra de torsión.

USO PREVISTO: El torniquete mecánico táctico se ha diseñado para controlar hemorragias graves de las extremidades.

PERFIL DEL USUARIO: El TMT se ha diseñado para ser utilizado por el público en general y por profesionales con formación en medicina.

PERFIL DEL PACIENTE: El TMT se ha diseñado para ser utilizado en pacientes con hemorragias graves de una extremidad.

CONTRAINDICACIONES: N/C

BENEFICIOS CLÍNICOS: El TMT controla la hemorragia de una extremidad a través de la compresión de la circunferencia de la extremidad lesionada (~5 cm por encima del área de sangrado), al menos hasta lograr una presión oclusiva arterial.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO: El dispositivo puede aplicar al menos 200 mmHg de presión.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: El dispositivo se compone de una vara para ajustar la presión y un sistema de bloqueo para controlar el flujo de sangre arterial de las extremidades inferiores y superiores. El dispositivo mantiene su eficacia durante todo el tiempo de uso previsto y durante el traslado del paciente. El dispositivo está disponible en varios colores. El diseño del dispositivo permite utilizarlo con una o dos manos. El dispositivo es de uso único; se puede adaptar a extremidades de distintas circunferencias. El dispositivo incluye una etiqueta para registrar la hora de la aplicación.

RIESGOS RESIDUALES/ADVERTENCIAS: Solo está indicado para el uso en extremidades. No se recomienda dejar el producto colocado por más de 2 horas. Es muy probable que al usarlo por más de 2 horas se produzcan daños en los nervios o en los tejidos. El riesgo aumenta acorde al tiempo de la aplicación. El dispositivo es de uso único. La reutilización genera riesgo de infección cruzada y pérdida de la funcionalidad del producto. Existe riesgo de sufrir una lesión de isquemia-reperfusión/síndrome postorniquete al retirar el torniquete, lo que puede representar un riesgo de pérdida de la extremidad o de vida. Desechelo como residuo médico después de su uso. El uso después de la fecha de caducidad genera riesgo de pérdida de la funcionalidad del producto.

DESECHO: Deséchelo como residuo médico después de su uso.

1. Hebilla de liberación rápida / **2.** Receptor de la hebilla de liberación rápida / **3.** Seguro de retención / **4.** Barra de torsión / **5.** Placa de soporte / **6.** Correa

Este dispositivo es de uso único. Siempre almacenar con la configuración para uso con una sola mano.

INSTRUCCIONES DE USO CON UNA SOLA MANO:

1. Sostenga el extremo de la correa con la pestaña blanca para registrar el tiempo, deje caer el TMT para que se abra con el símbolo "PULL" en dirección contraria a usted. Coloque el torniquete alrededor de la extremidad lesionada, ajustando por encima de la herida.

2. Tire de la pestaña blanca hasta que la correa superior se separe de la correa inferior.

3. Sujete la correa cerca de la hebilla, tire hacia arriba y hacia afuera con firmeza, alejándose del cuerpo, y después hacia abajo, con un movimiento rápido de trinquete. Repita el paso hasta que esté ajustado alrededor de la extremidad.

4. Acomode/rote el TMT en la extremidad para acceder con facilidad a la barra de torsión. Gire la barra de torsión hasta que se detenga la hemorragia y no se sienta el pulso.

5. Bloquee la barra de torsión con el seguro de retención. Asegure el exceso de correa envolviendo el torniquete y metiendo el sobrante debajo de él. Escriba de forma legible la hora de la aplicación en la pestaña para registrar la hora.

INSTRUCCIONES DE USO CON DOS MANOS:

1. Sostenga el extremo de la correa con la pestaña blanca para registrar el tiempo y deje caer el TMT para que se abra. Tome el TMT por la hebilla de liberación rápida y separe las dos secciones.

2. Envuelva la extremidad lesionada con el TMT, ajustando por encima de la herida y asegurándose de que el dispositivo no esté retorcido. Vuelva a cerrar la hebilla de liberación rápida.

3. Tire de la pestaña blanca hasta que la correa superior se separe de la correa inferior.

4. Sujete la correa cerca de la hebilla, tire hacia arriba y hacia afuera con firmeza, alejándose del cuerpo, y después hacia abajo, con un movimiento rápido de trinquete. Repita el paso hasta que esté ajustado alrededor de la extremidad.

5. Acomode/rote el TMT en la extremidad para acceder con facilidad a la barra de torsión. Gire la barra de torsión hasta que se detenga la hemorragia y no se sienta el pulso.

6. Bloquee la barra de torsión con el seguro de retención. Asegure el exceso de correa envolviendo el torniquete y metiendo el sobrante debajo de él. Escriba de forma legible la hora de la aplicación en la pestaña para registrar la hora.

PARA LIBERAR/RETIRAR EL TMT:

Desenvuelva el exceso de correa, ponga presión positiva en la barra de torsión, aplique presión hacia arriba en el seguro de retención y empuje la barra de torsión hacia afuera, después abra la hebilla de liberación rápida. Solo profesionales formados en medicina deben retirar el torniquete una vez colocado.

INFORMES: Todo incidente grave que ocurra en relación con este dispositivo debe informarse al fabricante (vigilance@safeguardmedical.com) y a la autoridad nacional competente relevante.

SWEDISH

PRODUKTNAMN: TMT – Tactical Mechanical Tourniquet

ALLMÄN BESKRIVNING: Tactical Mechanical Tourniquet (TMT) är ett tourniquet med ankarspel. Produkten består av en rem med kardborrefäste och ett styvt plastspänne, en fästanordning, en styrplatta och en vridstång.

AVSEDD ANVÄNDNING: Tactical Mechanical Tourniquet är avsett att användas för att kontrollera allvarlig blödning från en extremitet.

AVSEDDA ANVÄNDARE: TMT är avsett att användas av såväl civilpersoner utan medicinsk utbildning som av medicinskt utbildad sjukvårdspersonal.

PATIENTPROFIL: TMT ska användas på patienter med allvarlig blödning från en extremitet.

KONTRAINDIKATIONER: Ej relevant

KLINISKA FÖRDELAR: TMT kontrollerar blödning från en extremitet genom att ge cirkulär pressa ihop den skadade extremiteten (ca 5 cm ovanför det blödande området) med minst det tryck där arteriell ocklusion uppnås.

PRESTANDAEGENSKAPER: Produkten kan applicera ett tryck på minst 200 mmHg.

PRODUKTSPECIFIKA PÅSTÅENDEN: Produkten består av ett ankarspel och en låsfunktion som kontrollerar det arteriella blodflödet till övre och undre extremiteterna. Produkten bibehåller sin effektivitet under hela den avsedda användningstiden samt under patienttransport. Produkten finns i flera färgkombinationer. Produktens utformning är lämplig för tillämpning med en- eller tvåhandsfattning. Produkten är för engångsbruk och kan användas för extremiteter med omkretsar inom ett brett intervall. Produkten innehåller en speciell etikett för anteckning av tiden då den applicerades.

ÖVRIGA RISKER / VARNINGAR: Endast för användning på armar och ben. Rekommenderas inte att sitta på plats i mer än 2 timmar. Användning längre än 2 timmar kan potentiellt orsaka nerv- eller vävnadsskada. Risken ökar med längre appliceringstid. Produkt avsedd för engångsbruk. Återanvändning innebär en risk för korskontamination och för försämrad produktfunktion. När tourniqueten tas bort finns en risk för ischemi-reperfusionsskada/post-tourniquetsyndrom som kan hota extremiteten och vara livshotande. Kasseras som kliniskt avfall efter användning. Om produkten används efter utgångsdatumet finns risk för att den inte fungerar som avsett.

AVFALLSHANTERING: Kasseras som kliniskt avfall efter användning.

1. Snabbspänne / **2.** Fästanordning för snabbspänne / **3.** Hållarklämma / **4.** Vridstång / **5.** Bärplatta / **6.** Rem

Detta är en produkt för engångsbruk. Förvara alltid i konfiguration för enhandsfattning.

BRUKSANVISNING MED EN HAND:

1. Håll i den vita fliken med tidsetiketten i remmens ände och låt TMT öppnas med dragsymbolen vänd bort från dig. Placera runt den skadade extremiteten, högt och snävt ovanför såret.

2. Dra i fliken med tidsetiketten tills den övre remmen separeras från den nedre remmen.

3. Ta tag i remmen nära snabbspännet. Dra bestämt uppåt, utåt och bort från kroppen, och sedan nedåt, i en snabb spärrande rörelse. Upprepa steget tills det sitter tätt runt extremiteten.

4. Justera/rotera TMT på extremiteten så du enkelt kommer åt vridstången. Vrid vridstången tills blödningen upphör och ingen puls finns.

5. Lås vridstången i hållarklämman. Fäst den del